

Le Storie Napoleoniche

a cura del Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica

Numero 71 – 26 Ottobre 2024

medaglierenapoleonico@gmail.com

www.medaglierenapoleonico.com

Il Giardino di Josephine

22^a parte

In questa rubrica, mese dopo mese, vi mostreremo quali bellezze floreali contenesse il giardino della Malmaison al tempo di Giuseppina, attraverso le magnifiche incisioni del più grande illustratore botanico del suo tempo, Pierre-Joseph Redouté.

Costui, in collaborazione con un famoso botanico parigino, Etienne Pierre Ventenat, pubblicò dal 1803 al 1806 “Le Jardin de la Malmaison” un’opera divenuta una pietra miliare dell’illustrazione botanica, in cui vengono descritti oltre centoventi specie di rose e non solo, con cui l’amata prima moglie di Napoleone volle impreziosire la loro residenza privata alle porte di Parigi.

Josephine, che non faceva mai nulla di ordinario, non si accontentò di decorare il grande parco che circondava la residenza con specie floreali comuni, volendo invece che vi fossero impiegate solo essenze e specie mai prima impiantate in Francia trasformando così il proprio giardino in una sorta di museo botanico a cielo aperto.

Ancora oggi il giardino conserva alcune delle piante da lei volute anche se il passare del tempo e la mancanza della sua mano amica dei fiori, gli ha fatto perdere gran parte del suo fascino.



Anarrhina Cernua.

Dessiné par L. J. Robinet.

Gravé par L. J. Robinet.

ANAMENIA (1).

FAM. des RENONCULACÉES, *Juss.* — POLYANDRIE POLYGYNIE, *Linn.*

CHARACTER ESSENTIALIS. *Calyx* 5-phyllus. *Petala* 5 aut plura, ungue nudo. *Germina* receptaculo globoso imposita. *Baccæ* plurimæ, monospermæ. — Herba perennes. Folia radicalia, sæpius biternata; foliolis lateralibus plerùmque basi obliquè truncatis: rarò bipinnata. Flores in scapo umbellati. Habitus Umbelliferarum. Plantæ acerrimæ, pro vesicatoriis adhibite.

ANAMENIA CORIACEA.

ANAMENIA foliolis subcordatis, coriaceis, glabriusculis; lateralibus basi obliquè truncatis; umbellâ supradecompositâ, patentissimâ.

RANUNCULUS Æthiopicus foliis rigidis, floribus ex luteo virescentibus. *Commel. Hort. Amstelod.* pag. 1, tab. 1. — *CHRISTOPHORIANA* Africana ranunculoides, foliis rigidis. *Boerr. Lugdb.* 2, pag. 62. — *ADONIS Capensis.* *Linn. Spec. Plant.* pag. 772. *Willden. Spec. Plant.*

Plante herbacée, vivace, parsemée de quelques poils couchés et peu apparens, originaire du Cap de Bonne-Espérance, croissant sur les montagnes parmi les rochers. Elle passe l'hiver dans l'orangerie, et fleurit au printemps.

RACINE formée de plusieurs fibres allongées, munies d'un chevelu à leur base, de la grosseur d'une plume de corbeau, de couleur brune.

FEUILLES radicales, rapprochées en touffe, portées sur un pétiole presque droit, très-ouvertes et horizontales, deux fois ternées, coriaces, d'un vert foncé en dessus, d'un vert pâle et de couleur cendrée en dessous, larges de deux décimètres. **FOLIOLES PRIMAIRES** pétiolées, ordinairement ternées, rarement géminées ou simples. **FOLIOLES SECONDAIRES** presque en cœur, peu aiguës, concaves à leur base, renflées sur leurs bords, munies de dents glanduleuses à leur sommet; relevées de trois à cinq nervures qui se ramifient, parsemées de veines saillantes qui se croisent en forme de réseau; longues de sept centimètres, larges de quatre: les deux latérales presque sessiles, tronquées obliquement sur un des côtés de leur base, quelquefois divisées en deux lobes; l'impair ou la terminale pétiolée, ayant les côtés de sa base égaux, toujours simple et entière.

PÉTIOLE COMMUN presque droit, extrêmement dilaté à sa base qui embrasse le collet de la racine, convexe en dehors, creusé en dedans d'un large sillon; d'un vert cendré, long d'un décimètre, de la grosseur d'une plume à écrire. **PÉTIOTES** des **FEUILLES PRIMAIRES** écartés, horizontaux, renflés à leur base, de la forme et de la couleur du pétiole commun, longs de trois centimètres. **PÉTIOTES** des **FEUILLES SECONDAIRES** semblables à ceux des feuilles primaires: les deux latéraux extrêmement courts; celui de la foliole impaire long d'un centimètre.

HAMPE naissant du milieu des feuilles, montante, courbée, cylindrique, striée, d'un violet tendre, de la grosseur d'une plume de cygne, longue de quinze centimètres.

OMBELLE UNIVERSELLE surcomposée, très-étalée, concave, irrégulière, munie d'une collerette, formée d'un petit nombre de rayons. **RAYONS** de la forme et de la couleur

(1) Formé d'*Anahamen*, nom employé par les Arabes, pour désigner l'Adonis et l'Anémone.